

Safe Abortion with Mifepristone and Misoprostol

*Para embarazos de hasta 10 semanas**

** (La FDA aprobó este protocolo en los Estados Unidos. El protocolo de la OMS es de 12 semanas)*

Día 1




1. **Trague** una pastilla de Mifepristone (200 mg) con un vaso de agua.
2. Durante todo el proceso, puede comer y beber normalmente, pero evite drogas y alcohol.

Mifepristone



Espere 24 horas

La mayoría de las mujeres no tendrán ningún síntoma visible, pero algunas pueden tener un sangrado leve, náuseas, o calambres/cólicos.



Día 2

No debe estar sola! Debe pedir a alguien de confianza que la acompañe en caso de que necesite ayuda:

1. A la misma hora del día que tomó la pastilla de ayer, coloque 4 pastillas de Misoprostol (800mcg en total) entre las encías y la parte interior del carrillo con 2 de lado izquierdo y 2 de lado derecho.
2. Es muy importante que las pastillas se queden ahí por 30 minutos mientras disuelven. No coma ni beba durante este tiempo.
3. Después de esos 30 minutos puede tragar con agua los restos de pastilla que quedan.



Misoprostol




¿Cómo se siente cuando el aborto empieza?

Sentir calambres o cólicos y sangrado por varias horas es normal.

La mayoría del sangrado parará el día siguiente, pero puede haber sangrado leve por hasta 2 o 3 semanas.

Se puede tomar Ibuprofeno o Paracetamol para aliviar los cólicos.



¿Cuáles efectos secundarios podría sentir por las pastillas?

Después de tomar las 4 pastillas de Misoprostol, puede tener náuseas, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, y diarrea por varias horas.




¿Cómo puedo saber si tengo que ir al hospital?



Pérdida Abundante de Sangre:

Más de 2 toallas sanitarias en una hora por más de 2 horas.



Fiebre Alta:

Más de 38° o 38° por más de 24 horas.



Dolor Intenso:

Por más de unas pocas horas.

Para más información visite: www.womenhelp.org